

Teilbarkeitsliste der Zentralapotheke St.-Johannes-Hospital Dortmund

T = teilbar Z = zerreibbar A = auflösbar/suspendierbar

Präparat	Wirkstoff	T	Z	A	Alternative	Bemerkungen
Accupro 5,10,20mg Ftbl	Quinalapril	x	x	x		Lösen in Wasser möglich, Sondenapplikation ist möglich
Accuzide 10,20mg Ftbl	Quinalapril	x	x	x		Lösen in Wasser möglich, Sondenapplikation ist möglich
Aciclovir Ftbl Ratio	Aciclovir	x	x	x		
Acimethin Ftbl	L-Methionin	x	x	x		sofort verabreichen, Teilung schwierig, da keine Bruchkerbe vorhanden
Adalat Kapseln 5/10	Nifedipin	o	o	o	Aprical Tropfen	
Adalat SL ret Tbl	Nifedipin	o	o	o		
Adalat retard Tbl	Nifedipin	x	x	x		Nur grob zerkleinern ! Lichtschutz !!! Besser Tbl. suspendieren
Akineton Tbl	Biperiden	x	x	x	Akineton Amp sind trinkbar	
Akineton retard	Biperiden	o	o	o	Akineton Amp sind trinkbar	Retardeffekt geht verloren
Aldactone 25/50mg Drg	Spironolacton	o	o	o		
Alna Retkps	Tamsulosin	o	o	o		Retardprinzip: Pellets, Sondengabe nicht möglich (Quellung), Gabe mit Joghurt
Amaryl Tbl	Glimepirid	x	x	x		Keine Untersuchungen zur Stabilität !
Amoypen 1g Tbl	Amoxicillin	x	x	o	Amoxypen Saft/Tabs	Tabs sondenfähig (gut nachspülen!)
Anafranil 25mg Drg	Clomipramin	o	x	x		Schnellere Resorption beim Auflösen
Anafranil ret 75	Clomipramin	x	o	o	Anafranil 25mg s.o.	Retardeffekt geht verloren
Androcur Tabl	Cyproteronacetat	x	x	x		Steroidhormone schlecht wasserlöslich, ergibt Suspension, sondenfähig, gut nachspülen!
Anemet 200mg Tbl	Dolasetron	o	o	o	Anemet Amp 100mg	
Anti-Phosphat Ftbl	Aluminiumhydroxid-Gel	o	x	x		
Antra Mups Tbl 20 mg	Omeprazol	x	o	x		sondengängig
Aponal Ft 50 mg	Doxepin	x	x	x	Aponal Tropfen ,Amp	nur 50 mg teilbar
Aponal 10 /25mg Dra	Doxepin	o	x	x		
Aquaphor 10 /40mgTbl	Xipamid	x	x	x		unmittelbar vor Sondengabe in Wasser zerfallen lassen, nachspülen!
Arelix Tbl	Piretanid	x	x	x		Wirkstoff lichtempfindlich! direkt vor Verwendung zerfallen lassen
Arelix mite Tbl	Piretanid	x	x	x		Wirkstoff lichtempfindlich! direkt vor Verwendung zerfallen lassen
Aspirin 500 mg Tbl	Acetylsalicylsäure	x	x	x		Suspension in Wasser ist vorzuziehen
Atacand Tbl	Candesartan	x	x	o		

Teilbarkeitsliste der Zentralapotheke St.-Johannes-Hospital Dortmund

T = teilbar Z = zerreibbar A = auflösbar/suspendierbar

Präparat	Wirkstoff	T	Z	A	Alternative	Bemerkungen
Atosil Dra	Promethazin	o	o	o	Atosil Tropfen (20 Tro=10 mg)	
Augmentan Ftbl	Amoxicillin und Clavulansäure	x	o	o		Augmentan Tabs vorzuziehen
Aurorix Ftbl	Moclobemid	x	x	x		
Azulfidine Ftbl	Sulfasalzin	o	o	o		Magensaftresistenz für bessere Verträglichkeit
Bambec Tbl	Bambuterol	x	x	x		Retardierte Wirkung da WS Prodrug, nicht durch Tablettengerüst
Bayotensin Tbl	Nitrendipin	x	x	x	Bayotensin akut Phiole	Nur grob zerkleinern ! Lichtschutz !!! Besser Tbl. suspendieren, sondenfähig
Beloc-Zok Rtbl	Metoprolol	x	x	x		Mikropellets
Blopress 8/16mg Tbl	Candesartan	x	x	x		Sondenfähigkeit nicht untersucht, aber in Praxis gängig
Bricanyl Duriles Rtbl	Terbutalin	o	o	o	Bricanyl Amp	sonst wird Retardierungsprinzip zerstört
Bronchoretard	Theophyllin	o	o	x		Kapselinhalt aus kleinen Pellets, die nicht zerstört werden dürfen
Bronchoretard mite/forte	Theophyllin	o	o	x		Kapselinhalt aus kleinen Pellets, die nicht zerstört werden dürfen
BS Tbl	Butylscopolamin	o	x	x	BS Supp, Amp	
Carbimazol Ftbl	Carbimazol	x	x	x		zermörsern nicht zu empfehlen (Hautrötungen!), Filmüberzug aus geschmacklichen Gründen
Catapressan Tbl	Clonidin	x	x	o		
Catapressan Depot Perlong	Clonidin	o	o	o		Retardprinzip wird sonst zerstört
Cebion Tbl	Ascorbinsäure	o	x	o		swl. Hilfsstoffe behindern Sondengabe, Suspension instabil
Cedur ret Dra	Bezafibrat	o	o	o	Cedur: Zerkleinerung u. Suspendierbarkeit möglichkeit	Retardeffekt geht verloren, zu hohe WS -Konz bei Zerteilung
Ceolat Ktbl	Dimeticon	o	x	o		Sondengabe möglich
Chinidin duriles Rtbl	Chinidin	o	o	o		Kunststoffmatrix würde zerstört werden
Chloralhydrat blau Kap	Chloralhydrat	o	o	x		Sondengabe nicht empfehlenswert da ph zu sauer
Chloraldurat rot	Chloralhydrat	o	o	x		Sondengabe nicht empfehlenswert da ph zu sauer
Cholspasmin forte Ftbl	Hymecromon	x	x	x		beim Auflösen in Wasser auf vollständige Verabreichung achten!
Ciatyl-Z Tbl	Zuclopenthixol	o	o	o	Ciatyl Tropfen (20 Tro=23,8mg)	Lichtschutz

Teilbarkeitsliste der Zentralapotheke St.-Johannes-Hospital Dortmund

T = teilbar Z = zerreibbar A = auflösbar/suspendierbar

Präparat	Wirkstoff	T	Z	A	Alternative	Bemerkungen
Cipramil Ftbl	Citalopram	x	x	x		
Ciprobay 250/750 Ftbl	Ciprofloxacin	x	x	x	Ciprobay Saft(5%:5ml=250mg)	Filmüberzug zur Geschmacksüberdeckung
Claversal 500 Tbl msr	Mesalazin	o	o	o		Resorption nicht im Magen! sondern Darm
Clont 250mg/400mg Ftbl	Metronidazol	o	x			Filmüberzug zur Geschmacksüberdeckung
Colchicum dispert Dra	Colchicin	x	x	x		
ConcorTbl	Bisoprolol	x	x	x		nur Halbierung möglich, sondenfähig
Corangin Rtbl 40/60	Isosorbid-Monohydrat	x	o	o	Corangin 20 Tbl	
Cordarex Tbl	Amiodaron	x	x	x		WS lichtempfindlich! direkt vor Verwendung zerfallen lassen
Corvaton ret Rtbl	Molsidomin	x	o	o	Corvaton 2mg teilbar u. auflösbar oder Corvaton Amp	Matrixtablette! WS lichtempfindlich
Cotrim forte-Rat Tbl	Clotrimoxazol	x	x	x	Cotrim-E Saft	Tablette in Glas Wasser zerfallen lassen
Cytotec 200 Tbl	Misoprostol	x	x	x		WS lichtempfindlich! direkt vor Verwendung zerfallen lassen
Dapotum Tbl	Fluphenazin	x	o	x	Dapotum Tropfen(1ml=10mg)	WS lichtempfindlich! direkt vor Verwendung zerfallen lassen
Decortin Tbl /Decortin H	Prednison/Prednisolon	x	x	x		50/20 viertelbar,5/1 halbierbar
Dexium Kap	Calciumdobesilat	o	o	x		Kapseln öffnen
Diamox ret Tbl	Acetazolamid	o	o	x		Pellets dürfen nicht zerstört werden!
Diazepam-RatTbl	Diazepam	x	x	x	Diazepam Tropfen	
Dibenzylan Kap	Phenoxybenzamin	o	o	x		sofort verwenden(innerhalb von 5 min)!
Diclofenac 50 Tbl	Diclofenac					
Diflucan Kap	Fluconazol	o	o	o	Diflucan Saft(10 ml=50 mg)	Kapselinhalt sondenfähig, mit Wasser nachspülen
Digimerck Tbl	Digitoxin	x	x	x	Digimerck Tropfen(30 Tro=0,1mg)	
Digimerck mite Tbl	Digitoxin	o	x	x	Digimerck Tropfen(30 Tro=0,1mg)	Tbl kann in Wasser gegeben werden
Dihydergot ret Rtbl	Dihydroergotamin	o	o	o	Dihydergot Tropfen(20Tro=2mg)	Retardeffekt geht verloren
Dilzem retRtbl	Diltiazem	o	o	o	Dilzem parenteral Amp	WS in Wachsmaterial eingebettet
Dipiperon Tbl	Pipamperon	x	o	o	Dipiperon Saft	
Distraneurin Kap	Clomethiazol	o	o	o	Distraneurin Mixtur (5ml=1Kap)	
Dociton Tbl	Propranolol	x	x	x		
Dogmatil Kap	Sulpirid	o	o	o	Dogmatil Saft (5ml=25mg)	

Teilbarkeitsliste der Zentralapotheke St.-Johannes-Hospital Dortmund

T = teilbar Z = zerreibbar A = auflösbar/suspendierbar

Präparat	Wirkstoff	T	Z	A	Alternative	Bemerkungen
Dogmatil forte Tbl	Sulpirid	x	x	x	Dogmatil Saft (5ml=25mg)	
Dopergin Tbl	Lisurid	x	x	x		Gabe mit/nach Sondenkost verlangsamt Resorption=weniger Übelkeit
Dormicum Tbl	Midazolam	x	o	o	Dormicum Inj	
Doryl Tbl	Carbachol	o	x	x		Tablette in Glas Wasser zerfallen lassen
Doxycyclin Tabs	Doxycyclin	o	x	x		
Dreisavit	Vitamine	o	x	x		
Dridase	Oxybutynin	x	x	x		
Dytide H Tbl	Triamteren/Hydrochl rothiazid	x	x	x		
Ebrantil ret Kap 30/60/90	Urapidil	o	o	x		Pellets in Wasser suspendierbar
Elantan 40 Tbl	Isosorbid- Monohydrat	x	x	x		
Endoxan Dra	Cyclophosphamid	o	o	o		Zytostatikum, nicht zerkleinern!
Equilibrin Tbl 30/60mg	Amitriptylinoxid	x	o	o		
Ergenyl 300 Ftbl	Valproinsäure	o	o	o	Ergenyl Lösung(1ml=300mg)	
Ergenyl chrono	Valproinsäure	x	o	o	Ergenyl Lösung(1ml=300mg)	WS hygroskopisch!
Esidrix Tbl	Hydrochlorothiazid	x	x	x		Sondengabe der Suspension möglich
Euglucon N Tbl	Glibenclamid	x	x	x		
Eunerpan Dra	Melperon	o	x	x	Eunerpan Liquidum	Überzug zur Geschmacksabdeckung
Euthyrox Tbl	Levothyroxin	x	x	x		auch bei Kindern:Tabl in Glas Wasser zerfallen lassen
Exelon Kps	Rivastigmin	o	o	x		
Farluta	Medroxyprogesteron acetat	x	x	x	Farluta Susp.(1ml=500mg)	
Favistan Tbl	Thiamazol	x	x	x		viertelbar,WS lichtempfindlich!
Femara Ftbl	Letrozol	o	x	x		Frauen im gebärfähigen Alter nicht mörsern!Schwangere kein Kontakt!
Fenistil ret Rtbl	Dimetindenmaleat	o	o	o	Fenistil Tropfen(20Tro=1mg)	Zerstörung des Überzuges ändert Kinetik, sofortige Sedierung
Ferro sanol duo Kap	Fe II-glycin-sulfat-K	o	o	o	Ferro-Sanol-Tro(20Tro=30mg)	Kapsel kann geöffnet werden.Pellets sofort mit viel Wasser verabreichen!
Fluanxol 0,5mg Dra	Flupentixol	o	o	o	Fluanxol Tropfen(1ml=50mg)	Lichtschutz
Fluctin Kap	Fluoxetin	x	o	x	Fluctin Lösung(5ml=22,4mg)	Kapselinhalt in wenig Wasser suspendieren
Flutamid	Flutamid	o	x	x		
Folsan Tbl	Folsäure	x	x	x	Folsan Amp	in Wasser unlöslich

Teilbarkeitsliste der Zentralapotheke St.-Johannes-Hospital Dortmund

T = teilbar Z = zerreibbar A = auflösbar/suspendierbar

Präparat	Wirkstoff	T	Z	A	Alternative	Bemerkungen
Fortecortin Tbl	Dexamethason	x	x	x		viertelbar, sondengängig
Fugerel Tbl	Flutamid	x	x	x		WS bitter!
Furadantin ret Rkap	Nitrofurantoin	o	o	x		Kapselinhalt nicht mörsern / zerkleinern!
Furosemid ratio Tbl	Furosemid	x	x	x		
Gelonida Schmerztbl	Paracetamol/Codein	x	x	x	Gelonida Supp/Saft(enth zusätzlich ASS)	
Gelusil Lac Lutschtbl	Al-Mg-Silicathydrat	x	x	x	Gelusil Liquid, Gelusil Lac Pulver	
Glucobay 50mg Tbl	Acarbose	x	x	x		wässrige Lösung sofort verwenden!
Glucophage Fta	Metformin	x	x	x		Lösung zu bitter
Godamed Tbl	Acetylsalicylsäure-Glycin	x	x	x	Tablette langsam im Mund zergehen lassen	Glycin verbessert Magenverträglichkeit und Geschmack
Gutron Tbl	Midodrin	x	x	x	Gutron Tropfen(1ml=10mg)	
Haldol Tbl	Haloperidol	x	o	o	Haldol Tro(1ml=2mg)	Tabletten viertelbar
Harzol Kap	β-Sitosterin	o	o	x		Sondenappl:Kapselinhalt verdünnen,mischen mit Nahrung möglich
Hydrocortison 10 mg Tbl	Hydrocortison	x				
Hypnorex ret Rtbl	Lithiumcarbonat	x	x	x		Retardeffekt geht verloren,Tagesdois auf 3-4xtgl.Gaben verteilen
Hydergin forte Tbl	Dihydroergotoxin	x	x	x	Hydergin forte Tropfen	
Hypnorex ret Rtbl	Lithiumsalze	x	o	o		Tabletten dürfen nicht zerkleinert oder aufgelöst werden
Ideos Kautbl	Calciumcarbonat, Colecalciferol	x	x	x		
Imurek 25 Ftbl	Azathioprin	o	x	x	Imurek iv	Achtung:Kontaminationsschutz!giftige Stäube!Lichtschutz
Imurek 50 Ftbl	Azathioprin	x	x	x		Achtung:Kontaminationsschutz!giftige Stäube!Lichtschutz
Indomet Kap 25mg	Indometacin	o	o	x		Kapselinhalt ist ein Pulver
Insidon Dra	Opipramol	o	x	x		WS bitter!
Iscover Ftbl	Clopidogrel	o	x	x		erst unmittelbar vor Applikation verreiben
Ismo 20 Tbl	Isosorbidmononirat	x	x			keine Herstelleruntersuchung zur Sondenappl.
Isoket 120 ret Kap	Isosorbiddinitrat	o	o	x	Isoket Tbl	Kapselinhalt sondengängig
Isoket ret 20/40/60 Rtbl	Isosorbiddinitrat	x	o	o	Isoket Tbl	Matrixtablette
Isoket5/10/20 Tbl	Isosorbiddinitrat	x	x	x		WS schwer in Wasser löslich

Teilbarkeitsliste der Zentralapotheke St.-Johannes-Hospital Dortmund

T = teilbar Z = zerreibbar A = auflösbar/suspendierbar

Präparat	Wirkstoff	T	Z	A	Alternative	Bemerkungen
Isoptin Ftbl	Verapamil	x	x	x		Alginathydrokolloidmatrix löst sich nicht, WS löst sich heraus
Isoptin KHK Retardtbl	Verapamil	x	o	o		Retardierung geht verloren
Isoptin RR 240 Retardtbl	Verapamil	x	o	o	240mg=3x80mg	
Itrop Ftbl	Ipratropiumbromid	x	x	x		
Jodid Tbl	KI	x	x	x		
Jodthyrox Tbl	Levothyroxin	x	x	x		
Kalinor ret Rkps	KCl	o	o	o	Kalinor Brause	
Kalium Duriles Tbl	KCl	o	o	o	Kalinor Brause	
Klacid Ftbl	Clarithromycin	o	o	o	Klacid Drink(5gGranulat=250mg)	
Kliogest Ftbl	Estradiol u. Norethisteron	o	o	o	TTS -Pflaster	
Kohle Comretten Tbl	Med Kohle	x	x	x		
Kreon 25000 Kap	Pankreas Pulver	o	o	x	Kreon Granulat	magensaftresist.Mikropellets
Lanicor	Digoxin	x	x	x		
LanitopTbl	Metildigoxin	x	x	x		
Lasix Tabs Tbl	Furosemid	x	x	x		gut nachspülen, nicht mit sauren Lsgen mischen
Leponex Tbl	Clozapin	(x)	x	x		50mg nicht teilbar, WS löst sich nicht in Wasser(Bodensatz)
Leukeran Tbl	Chlorambucil	o	o	o		Zytostatikum
Leukovorin Tbl	Calciumfolinat	x	x	x	iv	
Lexotanil 6 Tbl	Bromazepam	x	x	x		sondengängig
Lioresal Tbl	Baclofen	x	x	x		Gabe zum Essen vermindert GIT-NW
Lopirin 25/Cor Tbl	Captopril	x	x	x		
Lorzaar 50mg Tbl	Lorsartan	x	x	x		
Ludiomil Fta	Maprotilin	x	x	x		teilbar nur 75mg, Film vermindert anästhesierende Wirkung, deswegen nur mit viel Wasser oder Sonde
Madopar Depot Rkps	Levodopa	o	o	o	Madopar LT	
Madopar Kap	Levodopa/Benserazid	o	o	x	Madopar LT	
Madopar LT Tbl	Levodopa	x	x	x		Firmenempfehlung:in Wasser gelöst einnehmen
Madopar T Tbl	Levodopa	x	x	o	Madopar LT	sehr sauerempfindlich

Teilbarkeitsliste der Zentralapotheke St.-Johannes-Hospital Dortmund

T = teilbar Z = zerreibbar A = auflösbar/suspendierbar

Präparat	Wirkstoff	T	Z	A	Alternative	Bemerkungen
Magnesium Verla Dra	Magnesium	o	o	o	Magnesium Kautbl/Brause/Konzentrat	
Maliasin Dra	Barbexalon	o	x	x		aufgelöste Tbl gut sondengängig, stets frisch
Marcumar Tbl	Phenprocumon	x	x	x		
Melleril 25 Dra	Thioridazin	o	x	x	Melleril Tropfen(1Tro=30mg)	Dragee schwer zu zerkleinern
Melleril ret Rtbl	Thioridazin	x	o	o	Melleril Tropfen(1Tro=30mg)	Matrixtbl lässt sich schwer teilen u vierteln
Melperon 25 Dra	Melperon	o	x	x	Melperon Saft	
Mestinon 10 Tbl	Pyridostigmin	0	x	x		
Mestinon 60 Dra	Pyridostigmin	o	x	x		zermörsern nicht zu empfehlen, Tbl löst sich gut in Wasser
Metalcaptase Ftbl	Penicillamin	o	o	o		Magenprobleme
Methergin Dra	Methylergometrin	o	o	o	Methergin Tropfen, iv	
Mevinacor Tbl	Lovastatin	x				
Mexetil Kap	Mexitilin	o	o	o	Umstellung auf anderes Antiarrhythmikum	
Modip Rtbl	Felodipin	o	o	o		Hydrophile Gelmatrix darf nicht zerstört werden
Mono Mack Depot Tbl	Isosorbidmononitrat	x				Tablette halbierbar, unzerkaut einnehmen
Movergan Tbl	Selegilin	x	o	x		
MST Tbl 10/30/60/100/120 Morphin		o	o	o	MSI-Lsg, MSR-Supp, MST- Granulat	Retardtbl
Multibionta Kap	Vitamine	o	o	o	Multibionta Tropfen/Ampullen	Vitamine sind ausreichend in der Sondennahrung enthalten
Myambutol Fta	Ethambutol	o	x	x		400mg Tbl teilbar
Mylepsinum Tbl	Primidon	x	x	x		WS schwer in Wasser löslich, sondengängig
MyocholineGlenwood TblBethanechol		x	x	x		
Nacom 100 ret Rtbl	Carbidopa/Levodopa	o	o	o	Nacom Tbl	
Nacom 100 Tbl	Carbidopa/Levodopa	x	x	x		Suspension ist nicht stabil, WS werden an Luft oxidiert, sofort verarbeiten
Nacom 200 ret Rtbl	Carbidopa/Levodopa	x	o	o		Retardeffekt geht durch Teilung nicht verloren
Navoban Kap	Tropisetron	x	x	x	Navoban Amp(auch trinkbar)	WS hygroskopisch, Einnahme 1 h vor Essen
Nepresol Tbl	Dihydralazin	x	x	x		sondengängig

Teilbarkeitsliste der Zentralapotheke St.-Johannes-Hospital Dortmund

T = teilbar Z = zerreibbar A = auflösbar/suspendierbar

Präparat	Wirkstoff	T	Z	A	Alternative	Bemerkungen
Neurotrat S forte	Thiamin, Pyridoxin	o	x		Neurotrat forte Injektionslsg	
Neurocil Tbl	Levopromazin	(x)	o	o	Neurocil Tropfen(1Tro=1mg)	nur 100mg teilbar
Nimotop Tbl	Nimodipin	o	o	o		
Nipolept Dra	Zotepin	o	o	o		
Nitrolingual Kap	Glycerolnitrat	o	o	o	Nitrolingual Dosier/Pumpspray	
Nolvadex Tbl 10mg	Tamoxifen	x	x	x		
Normabrain Ftbl	Piracetam	x	x	x	Normabrain Granulat	mit viel Flüssigkeit spülen
Norvasc Tbl	Amlodipin	x	x	x		
Novaminsulfon rat Tbl	Metamizol	x	x	x	Novaminsulfon Tropfen(20Tro=500mg)	
Novodigal 0,1/0,2 Tbl	Acetyldigoxin	x	o	x		in 3-5ml Wasser zerfallen lassen u Suspension verabreichen
Ossin Dra	Natriumfluorid	o	o	o	wenn Osteoporoseprophylaxe erforderlich anderes Therapieprinzip	magensaftresistente Retarddragees
Ostac Kap	Clodronsäure	o	o	x		
Ovestin Tbl	Estriol	x	o	o		
Oxygesic Tbl 10/20/40	Oxycodon	o	o	o	MST Granulat	
Panoral Kap	Cephaclor	o	o	o	Panoral Saft/TS(5ml=125mg=1Meßl)	
Pantozol Tbl	Pantoprazol	o	o	o	Antra Mups	nicht sondengängig!
Panzytrat Rkps	Pankreatin	o	x	x		Pellets dürfen nicht zerbissen werden!Verlust der Magensaftresistenz
Paracefan Tbl	Clonidin	x	x	x		suspensierbar,Tabletten vorher zerkleinern
Paracetamol Tbl	Paracetamol	x	x	x	ben-u-ron Saft(5ml=200mg)	
ParacodinTbl	Dihydrocodein	x	o	o	Paracodin Tropfen(20Tro=10mg)	
Parkotil Tbl	Pergolid	x	o	x		in Wasser suspendieren
Partusisten Tbl	Fenoterol	x	x	x	Partusisten Inj	auf quantitative Applikation achten,mit reichlich
Penhexal Mega Tbl	Phenoxymethylpenicillin	x	x	x	Megacillin Saft, Penicillin Giv wird nicht resorbiert	
Penicillin V ratio Ftbl	Phenoxymethylpenicillin	x	x	x	Penicillin V TS	
Phenhydan Tbl	Phenytoin	x	x	x		Phenytoin interagiert mit Sondennahrung,Gabe zwischen Sondenkost



Teilbarkeitsliste der Zentralapotheke St.-Johannes-Hospital Dortmund

T = teilbar Z = zerreibbar A = auflösbar/suspendierbar

Präparat	Wirkstoff	T	Z	A	Alternative	Bemerkungen
PK-Merz Ftbl	Amantadin	o	x	x		Filmüberzug zur Überdeckung des bitteren Geschmacks
Polybion N Dra	Vit B Komplex	o	o	o	Polybion Tropfen nur bei ausgeprägtem Mangel	Vitamine sind ausreichend in der Sondennahrung enthalten
Pravidel Tbl	Bromocriptinmesilat	x	x	x		
Presinol Ftbl	Methyldopa	x	x	x		Lichtschutz
Procorum ret RTA	Gallopamil	o	o	o	Procorum Tbl	nicht sondengängig
Pyrafat Ftbl	Pyrazinamid	(x)	x	x		Filmüberzug als Licht- u Feuchtigkeitschutz, nur 500mg teilbar
Quilonum ret Rtbl	Lithiumcarbonat	o	o	o		Retardierung geht verloren
Ranitic 300mg Ftbl	Ranitidin	x	x	x	Ranitic 50mg Amp	
Rastinon 1,0 Tbl	Tolbutamid	o	x	x		keine Untersuchung zur Stabilität
Remergil Ftbl	Mirtazapin	x	x	x		Filmüberzug schützt vor lokalanästhetischer Wirkung
Remestan Kap	Temazepam	o	o	x	anderes Benzodiazepin	
Resimatil Tbl	Primidon	x	o	x		
Rocaltrol 0,25µg Kap	Calcitriol	o	o	o		
Rhythmodul Kap	Disopyramid	o	x	x		Filmüberzug schützt vor lokalanästhetischer Wirkung
Rifa Dra	Rifampicin	o	x	x		Rifampicin ist stark färbend
Rifun Tbl	Pantoprazol	o	o	o	Antra Mups(sondenfähig)	
Risperdal Ftbl	Risperidon	x	o	o	Risperdal Lsg (1ml=1mg)	
Rivotril Tbl	Clonazepam	x	x	x	Rivotril Tropfen (25Tro=2,5mg)	Verreibung mit Puderzucker,dann in Wasser
Rohypnol Ftbl	Flunitrazepam	x	x	x		
Rytmonorm 150/300 Ftbl	Propafenon	(x)	x	x		nur 300mg teilbar
Saroten 10mg Dra	Amitriptylin	o	o	o	Saroten Kap	es liegen keine Erfahrungen vor
Saroten Rkap 25mg	Amitriptylin	o	x	x		Pellets können in Sonde verabreicht werden,aber Sonde kann verstopfen,Retardierung bleibt erhalten
Saroten Rkap 50mg	Amitriptylin	o	o	o	Saroten Kap	Pellets können in Sonde verabreicht werden,aber Sonde kann verstopfen,Retardierung bleibt erhalten
Sevredol Tbl 10/20mg	Morphin	x	x	x		
Siofor 850/500 mg	Metformin	(x)	o	o		nur 850 teilbar
Sirdalud 4mg Tbl	Tizanidin	x	x	x		bei jejunaler Sondenlage 20% Resorption

Teilbarkeitsliste der Zentralapotheke St.-Johannes-Hospital Dortmund

T = teilbar Z = zerreibbar A = auflösbar/suspendierbar

Präparat	Wirkstoff	T	Z	A	Alternative	Bemerkungen
Sotalex Tbl	Sotalol	x	x	x		Tablette in Glas Wasser zerfallen lassen, engmaschige Kontrolle der Herzrhythmik
Spasmex Tbl	Trospiumchlorid	(x)	x	x		Ws sehr bitter, 5mg nicht teilbar
Spiro comp Ftbl	Spironolacton/Furos.	o	x	x		
Spiro comp forte Ftbl	Spironolacton/Furos.	x	x	x		
Stangyl Tbl	Trimipramin	x	x	x	Stangyl Tropfen(1Tro=1mg)	unangenehmer Geschmack
Staphylex Kap	Flucloxacillin	o	o	x		sondengängig, nüchtern einnehmen, Abstand Sondennahrung 30min
Staphylex 500 Kap	Flucloxacillin	o	o	x		Kapselinhalt in Tee verabreichen(1h vor dem Essen)
Tagonis Ftbl	Paroxetin	x	o	o	Tagonis Granulat	
Tamoxifen Tbl	Tamoxifen	x	x	x		
Tavor 0,5 Tbl	Lorazepam	o	x	x		
Tavor 1,0 Tbl	Lorazepam	x	x	x		
Tavor expidet	Lorazepam	o	o	x		unmittelbar vor Verabreichung auflösen
Taxilan Tbl	Perazin	x	x	x	Taxilan Tropfen(22Tro=44mg)	
Taxilan Dra	Perazin	o	x	x	Taxilan Tropfen(22Tro=44mg)	
Tebesium 200 Tbl	Isoniazid/Pyridoxin	x	x	x		Filmüberzug verdeckt schlechten Geschmack
Tebesium Tbl 300/400	Isoniazid/Pyridoxin	o	x	x		Filmüberzug verdeckt schlechten Geschmack
Tegretal 400 ret Rtbl	Carbamazepin	x	o	x	Tegretal Susp(5ml=100mg) ohne Retardierung	Tablette in lauwarmem Tee lösen und sofort verabreichen
Tenormin Fta	Atenolol	(x)	x	x		Tenormin 25 nicht teilbar, Suspension sofort verabreichen
Tesoprel Tbl	Bromperidol	x	x	x	Tesoprel Tropfen(20Tro=2mg)	
Thioctacid 200 Ftbl	alpha Liponsäure	o	o	o	Thioctacid Amp	
Thombran Tabs Ftbl	Trazodon	x	x	x		
Thombran mite Kap	Trazodon	o	o	x		
Tiklyd Ftbl	Ticlopidin	o	x	x		erst unmittelbar vor der Applikation verreiben
Timonil ret Rtbl	Carbamazepin	x	o	x	Timonil Saft(5ml=100mg),keine Retardierung	Tablette in Wasser zerfallen lassen
Tolvin Ftbl	Mianserin	x	x	x		Filmüberzug schützt vor lokalanästhetischer Wirkung

Teilbarkeitsliste der Zentralapotheke St.-Johannes-Hospital Dortmund

T = teilbar Z = zerreibbar A = auflösbar/suspendierbar

Präparat	Wirkstoff	T	Z	A	Alternative	Bemerkungen
Tramal long Rtbl	Tramadol	o	o	o	Tramal Tropfen(20Tro=50mg)ohne Retardierung=3-4xtgl	Matrixtablette
Transbronchin Kap	Carbocystein	o	o	x	Transbronchin Sirup,besser ACC-Tabs(Acetylcystein)	
Tranxilium Ftbl	Dikaliumchlorazepam	x	o	x		
Tranxilium Kap	Dikaliumchlorazepam	o	o	x		
Traumanase forte Dra	Bromelaine	o	o	o		Dragee darf nicht gemörsert werden(Magensaftresistenz)
Tremarit Tbl	Metixen	x	x	x		
Trental 600 Rtbl	Pentoxyphyllin	(x)	o	o	Trental Amp auch über Sonde applizierbar	
Trevilor ret Rkps	Venlafaxin	o	o	x		deutlich weniger Übelkeit durch Mikropellets
Trevilor Tbl	Venlafaxin	x	x	x		
Truxal Dra	Chlorprothixen	o	x	x	Truxal Suspension(1ml=20mg)	
Ulcogant Tbl	Sucralfat	x	x	x	Ulcogant Suspension	Inkompatibilität mit Sondennahrung,Zeitabstand und Spülen wichtig!
Unat Tbl	Torasemid	x	x	x		
Uro-Tablinen Tbl	Nitrofurantoin	(x)	x	x		nur mit Messer o.ä.teilbar,da sehr klein
Valdispert Dra	Baldrianwurzelextrakt	o	x	x	Baldriantinktur	starker Baldriangeruch bei Zerkleinerung
Vasomotal Tbl	Betahistidin	o	x	x	Vasomotal Tropfen(1ml=8mg)	
Vasomotal forte Tbl	Betahistidin	x	x	x		
Vergentan Tbl	Alizaprid	x	x	o	Vergentan Amp sind trinkbar	Einnahme direkt vor und nach Zytostatikatherapie
Vigantoletten Tbl	Vit D3(Cholecalciferol)	x	x	x		
Vitamin B1 Tbl	Vit B1	x	x	x		Vitamine sind ausreichend in der Sondennahrung vorhanden
Vitamin E Kap	Vit E	o	o	o		Vitamine sind ausreichend in der Sondennahrung vorhanden
Voltaren 25 Dra	Diclofenac	o	o	o	Voltaren Supp,Voltaren dispers	Schutz vor Magenbeschwerden

Teilbarkeitsliste der Zentralapotheke St.-Johannes-Hospital Dortmund

T = teilbar Z = zerreibbar A = auflösbar/suspendierbar

Präparat	Wirkstoff	T	Z	A	Alternative	Bemerkungen
Voltaren dispers Tbl	Diclofenac	o	x	x		zerfallen rasch in Wasser
Voltaren resinat Kap	Diclofenac	o	o	o	Voltaren Supp, Voltaren dispers	Retardierungsprinzip wird beim Zerkleinern zerstört
Xanef Tbl	Enalapril	x	x	x		es liegen jedoch keine Studien vor
Ximovan Ftbl	Zopiclon	x	o	o		
Zentropil 100mg Tbl	Phenytoin	x	x	x		problematisch.am besten 100mg Zerreibung in 250ml Wasser lösen 2h Abstand zur SK-Applikation
Zinnat Ftbl	Cefuroxim	o	o	o	Zinnat TS (5ml=125mg)	
Zithromax Kap	Acithromycin	o	o	x	Zithromax TS(5ml=200mg)	schlecht wasserlöslich,gut nachspülen,wenn Kapsel geöffnet wird
Zofran Ftbl	Ondansetron	o	x	x		Tablette nach Verreibung sofort verabreichen
Zyloric Tbl	Allopurinol	x	x	x		Tablette läßt sich ohne Probleme in Wasser suspendieren, auf vollständige Verabreichung achten
Zyprexa Ftbl	Olanzapin	o	x	x		Tablette zermörsern und Pulver in Wasser suspendieren, dann mit Sonde verabreichen